

Памятка пациенту перед операцией под местной анестезией

Если у Вас планируется операция под местной анестезией, необходимо:

- предупредить лечащего врача обо всех имеющихся аллергических реакциях (лекарственных, пищевых, сезонных) и лекарствах, которые Вы принимаете на постоянной основе.
- за 10 дней до операции исключить прием препаратов, влияющих на свертывающую систему крови: аспирин/ кардиомагнил/ тромбо АСС/ далтепарин натрия/ эноксапарин/ варфарин/ клопидогрел/ ксарелто/ ривароксабан/ эликвис/ прадакса/ клексан/ фраксипарин/ фондрапаринукс/ арикстра и др
- на момент операции быть без признаков ОРЗ и других острых воспалительных и аллергических заболеваний.
- запланировать период восстановления после операции в течение недели без физических нагрузок, перелетов в самолете, посещения бани/ сауны
- за 2 дня до операции принимать препарат этамзилат/дицинон в дозировке 250 мг по 2 таб. 2 раза в день для улучшения свертывания крови

Женщинам рекомендовано планировать оперативное вмешательство вне менструального цикла и за 2 дня до него в связи со сниженной свертываемостью крови в этот период. В случае невозможности явиться на операцию в запланированный день, просьба заранее сообщить об этом для переноса хирургического лечения.

**Запись на операцию проводится
после осмотра врача по тел. +79272607090
Менеджер Варданян Лиана Аветисовна**

*Желаем Вам позитивного настроения и успешного выздоровления!
Клиника "Метод Лунёва"*